УДК 616.71-006-053.2
DOI: 10.35693/2500-1388-2022-7-2-134-138

Лечение плосковальгусной деформации стоп тяжелой степени у ребенка

© О.Д. Багдулина, Ю.В. Ларцев, А.В. Шмельков, А.С. Панкратов,
Н.Э. Лихолатов, Д.А. ОгурцовФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России (Самара, Россия)

Аннотация

Плосквальгусная деформация стоп является одним из наиболее распространенных ортопедических заболеваний опорно-двигательной системы, выявляемых в детском возрасте. По данным литературы, у 70% детей до 11 лет выявляется плосковальгусная деформация стоп различной степени тяжести. Распространенными осложнениями данной деформации без своевременной коррекции являются артроз таранно-ладьевидного сустава, вальгусная деформация коленных суставов, нарушение осанки и функциональный сколиоз, болевой синдром, вплоть до нарушения функции нижних конечностей, что является показанием для хирургического лечения данной патологии.

В статье приведен клинический случай оперативного лечения пациента с плосковальгусной деформацией стоп тяжелой степени. Основными этапами хирургической коррекции являлись сухожильно-мышечная пластика, подтаранный артролиз и остеотомия Коттона (расклинивающая остеотомия медиальной клиновидной кости).

На основании полученных результатов хирургического лечения сделан вывод о клинической обоснованности применения комбинации способов для лечения пациентов с плосковальгусной деформацией стоп тяжелой степени.

Ключевые слова: плосковальгусная деформация стоп, дети, вторичные деформации, оперативное лечение стоп, клинический пример.

Конфликт интересов: не заявлен.

Для цитирования:

Багдулина О.Д., Ларцев Ю.В., Шмельков А.В., Панкратов А.С., Лихолатов Н.Э., Огурцов Д.А. Лечение плосковальгусной деформации стоп тяжелой степени у ребенка. *Наука и инновации в медицине*. 2022;7(2):134-138. doi: 10.35693/2500-1388-2022-7-2-134-138

Сведения об авторах

Багдулина О.Д. – аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова.
ORCID: 0000-0003-1111-900X

E-mail: o.d.bagdulina@samsmu.ru

Ларцев Ю.В. – д-р мед. наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова.
ORCID: 0000-0003-4450-2486

E-mail: yu.v.lartsev@samsmu.ru

Шмельков А.В. – канд. мед. наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова.
ORCID: 0000-0001-6900-0824

E-mail: a.v.shmelkov@samsmu.ru

Панкратов А.С. – канд. мед. наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова.
ORCID: 0000-0002-6031-4824

E-mail: a.s.pankratov@samsmu.ru

Лихолатов Н.Э. – аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова.
ORCID: 0000-0002-6677-5277

E-mail: n.e.liholatov1@samsmu.ru

Огурцов Д.А. – канд. мед. наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова.
ORCID: 0000-0003-3830-2998

E-mail: d.a.ogurcov@samsmu.ru

Автор для переписки

Багдулина Ольга Дмитриевна

Адрес: Самарский государственный медицинский университет,
ул. Чапаевская, 89,
г. Самара, Россия, 443099.

E-mail: o.d.bagdulina@samsmu.ru

Рукопись получена: 05.02.2022

Рецензия получена: 26.02.2022

Решение о публикации принято: 19.03.2022

Treatment of severe planovalgus foot deformity in a child

© Olga D. Bagdulina, Yurii V. Lartsev, Andrei V. Shmelkov, Aleksandr S. Pankratov,

Nikita E. Likhlatov, Denis A. Ogurtsov

Samara State Medical University (Samara, Russia)

Abstract

Planovalgus foot deformity is one of the most common orthopedic conditions detected in childhood. According to the literature, it is present in 70% of children under 11 years with various degree of severity. Without timely correction, the common complications of this deformity are: arthrosis of the talonavicular joint, valgus deformity of the knee joints, impaired posture and functional scoliosis, pain syndrome, impaired function of the lower extremities, which is an indication for surgical treatment of this pathology.

The article presents a clinical case report of surgical treatment of a patient with severe planovalgus foot deformity. The main stages of surgical correction were tendon-muscle plasty, subtalar arthroeresis and Cotton

osteotomy (wedging osteotomy of the medial sphenoid bone).

Relying on the results of surgical treatment of the patient, we conclude that the use of the combination of methods is valid for the treatment of patients with severe planovalgus foot deformity.

Keywords: planovalgus foot deformity, children, secondary deformities, foot surgery, clinical case.

Conflict of interest: nothing to disclose.

Citation

Bagdulina OD, Lartsev YuV, Shmelkov AV, Pankratov AS, Likhlatov NE, Ogurtsov DA. Treatment of severe planovalgus foot deformity in a child. *Science & Innovations in Medicine*. 2022;7(2):134-138. doi: 10.35693/2500-1388-2022-7-2-134-138

Рисунок 1. Внешний вид стоп до операции.
Figure 1. Appearance of feet before surgery.

пяточных костей, контурирование ладьевидных костей.

Сбор жалоб: пациент жаловался на боли в стопах и голеностопных суставах при прохождении дистанции более 300 метров и во время занятий физкультурой, быструю «снашиваемость» обуви по внутренним поверхностям и косметический дефект стоп.

Изучение анамнеза заболевания: по словам пациента и его матери, деформация стоп отмечалась с первого класса школы, пациент лечился консервативно, амбулаторно, но без видимого клинического результата. Около 3 лет назад стал отмечать боли в стопах и голеностопных суставах, которые с течением времени стали более продолжительными и ярко выраженными.

Клинические тесты: были произведены мануальные пробы на выявление ригидности деформации, тест Губшера – Джека, тест на оценку объема движений в подтаранном суставе, тест «элевации ладьевидной кости» и др.

Рентгенография стоп под нагрузкой: оценивались такие показатели, как угол продольного свода стопы, который образуется пересечением двух касательных – одна к подошвенной поверхности пяточной кости, другая – к подошвенной поверхности первой плюсневой кости (в норме угол продольного свода стопы равен $125\text{--}130^\circ$, высота свода $> 35\text{ мм}$); угол Кайта, образованный пересечением продольных осей таранной и пяточной костей (норма $25\text{--}55$ градусов); угол Meary – между первой плюсневой и таранной костью (в норме не должен превышать 4 градусов (**рисунки 1, 2**)).

По результатам осмотра было принято решение об оперативном лечении пациента.

В июне 2021 года пациент был госпитализирован в детское травматолого-ортопедическое отделение Клиник СамГМУ в плановом порядке. Было выполнено оперативное вмешательство на правой стопе.

Выполняли операцию следующим образом: положение пациента лежа на спине; на среднюю треть бедра был наложен пневможгут. Производили обработку операционного поля и стерильную укладку.

Рисунок 2. Рентгенограмма правой стопы в боковой проекции под нагрузкой.
Figure 2. X-ray of the right foot in the lateral projection under load.

Первым этапом осуществляли частичную ахиллотомию по Байеру с последующей мануальной редрессацией голеностопного сустава. Далее производили сухожильно-мышечную пластику в виде транспозиции и тенodesа сухожилия передней большеберцовой мышцы в расщеп ладьевидной кости с трансоссальной фиксацией нерассасывающимся шовным материалом. Благодаря этому «формировали» поперечный свод, производя коррекцию деформации среднего отдела стопы (**рисунком 3**).

Далее по латеральной поверхности в проекции подтаранного синуса выполняли разрез длиной до 2 см, область синуса освобождали от мягких тканей и подкожно-жировой клетчатки и при помощи специализированного набора инструментов и мануальных проб оценивали размер синуса с последующей установкой подтаранного импланта под ЭОП-контролем. Эта манипуляция выполнялась для устранения вальгусного компонента деформации и коррекции заднего отдела стопы.

Следующим этапом производили линейный разрез до 5 см в нижней трети голени в проекции

Рисунок 3. Формирование свода стопы.
Figure 3. Arch of the foot formation.

Рисунок 4. Забор трансплантата из малоберцовой кости.
Figure 4. Fibular graft harvesting.

малоберцовой кости. Поднадкостнично, с минимальной травматизацией мягких тканей выполняли забор части малоберцовой кости (одного кортикала) и подготавливали его для дальнейшей имплантации и импакции в зону остеотомии медиальной клиновидной кости (**рисунок 4**).

При помощи пилы выполняли клиновидную расклинивающую низводящую остеотомию медиальной клиновидной кости с установкой ранее подготовленного аутографта, тем самым опуская 1 луч стопы и устраняя излишнюю пронацию, исправляя деформацию переднего отдела (**рисунок 5**).

Далее производили послойное ушивание тканей с наложением асептической повязки. Внешняя иммобилизация в положении коррекции на 6 недель.

В раннем послеоперационном периоде проводилась противовоспалительная, обезболивающая и антибиотикотерапия по схеме. Пациент был обучен ортопедическому режиму, разрешалось хождение на костылях без нагрузки на оперированную конечность, статическая гимнастика до момента снятия внешней иммобилизации (6 недель).

Через 6 недель пациент пришел на снятие повязки и контрольный осмотр, активных жалоб не предъявлял. В плановом порядке было проведено реабилитационное лечение и назначена дата операции для коррекции левой стопы.

В ноябре 2021 года пациент К. был вновь госпитализирован в детское травматолого-ортопедическое отделение Клиник СамГМУ на плановое оперативное лечение. После предоперационной подготовки на левой стопе выполнена аналогичная манипуляция, как на правой 6 месяцев назад. Протокол ведения данного пациента остался неизменным.

В середине декабря 2021 года, согласно плану лечения, была снята иммобилизирующая полиуретановая повязка с левой нижней конечности. Активных жалоб пациент не предъявлял.

Следующая контрольная явка пациентом была осуществлена в январе 2022 года после прохождения полноценного курса реабилитационного лечения.

Рисунок 5. Импакция трансплантата в зону остеотомии медиальной клиновидной кости.
Figure 5. Impression of the graft into the zone of osteotomy of the medial sphenoid bone.

На контрольном осмотре отмечалась положительная динамика, проявляющаяся в виде полного отсутствия болевого синдрома на правой стопе, уменьшения выраженности болевых ощущений на левой стопе. Рентгенологические и фотоплантографические показатели были в пределах референтных значений данной возрастной группы. Показатели мануальных и функциональных тестов также улучшились (**рисунки 6, 7**).

■ ОБСУЖДЕНИЕ

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Об этом свидетельствует распространенность заболевания и большое количество предлагаемых способов лечения.

Стопа выполняет амортизирующую функцию, подстраиваясь под рельеф проходимой поверхности, тем самым предохраняя суставы от постоянной травматизации. Плосковальгусная деформация стоп не является изолированной проблемой, и отсутствие должного лечения может привести к раннему развитию вторичных деформаций.

Возрастная группа пациентов – дети школьного возраста. Поэтому основной задачей детского ортопеда является сокращение сроков реабилитационного восстановления и уменьшение вероятности повторных вмешательств. Это реализуется путем применения индивидуального подхода в выборе тактики лечения, исходя из возрастных анатомических и физиологических особенностей. Предпочтение отдается комбинированным способам оперативного лечения.

При первичном обращении большинство пациентов с плосковальгусной деформацией стоп предъявляет жалобы на быструю утомляемость и боли в стопах и голеностопных суставах, что обусловлено нарушением распределения нагрузки на отделы нижних конечностей. Уровень жизни таких пациентов значительно снижается, ребенок не хочет заниматься спортом и социально развиваться. Это побуждает родителей задуматься об оперативном лечении, особенно если до

Рисунок 6. Внешний вид стоп после оперативного лечения.
Figure 6. The appearance of the feet after surgery.

момента явки на осмотр меры консервативного воздействия применялись уже неоднократно.

В рассматриваемом клиническом случае после хирургической коррекции пациентом отмечено уменьшение болевого синдрома вплоть до полного исчезновения при ведении обычной жизни, а нами как специалистами – улучшение анатомических взаимоотношений, о чем свидетельствуют результаты дополнительных клинических и инструментальных исследований.

■ ВЫВОДЫ

На основании клинического наблюдения, полученных данных и результатов представленного

Рисунок 7. Рентгенограмма левой стопы под нагрузкой после оперативного лечения.
Figure 7. X-ray of the left foot under load after surgical treatment.

клинического случая можно сделать вывод об эффективности комбинированного способа оперативного лечения детей с плосковальгусной деформацией тяжелой степени. За счет восстановления анатомической конгруэнтности суставных поверхностей, взаимоотношения отделов стопы, воздействия на три отдела, работы с костными и мягкоткаными компонентами стопа приобретает физиологически правильную форму. Благодаря применению данного вида оперативной коррекции достигается хороший клинический эффект, уменьшается время реабилитационного периода, восстанавливается функция конечности. ■

Конфликт интересов: все авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- de Pellegrin M. Subtalar screw-arthroereisis for correction of flat foot in children. *Orthopade*. 2005;34(9):941-53.
- Lapkin YuA, Kenis VM. Variants of severe static flat-valgus foot deformity in children. *Medicine of Kyrgyzstan*. 2011(4):174-176. (In Russ.). [Лапкин Ю.А., Кенис В.М. Варианты статической плоско-вальгусной деформации стоп тяжелой степени у детей. *Медицина Кыргызстана*. 2011;4:174-176].
- Chang JH. Prevalence of flexible flatfoot in Taiwanese school-aged children in relation to obesity, gender and age. *Eur J Pediatr*. 2010;169(4):447-52.
- Vavilov MA, Blandinsky VF, Gromov IV, et al. Arthrodesis operations in children over 10 years old with foot deformities of various etiologies. *Orthopedic genius*. 2016;3:2-3. (In Russ.). [Вавилов М.А., Бландинский В.Ф., Громов И.В., и др. Артодезирующие операции у детей старше 10 лет с деформациями стоп различной этиологии. *Теней ортопедии*. 2016;3:2-3].
- Tomov A, Bidjamshin R, Evreinov V, et al. Results of single-event multilevel orthopedic surgery in children with cerebral palsy. *Adv Pediatr Res*. 2015;2:24-25. doi: 10.12715/apr.2015.2.25
- Avdeev AK, Ryzhikov DV, Gubina EV, et al. Immediate results of subtalar biodegradable arthroereisis in children and adolescents. In: Materials X All-Russian. scientific-practical. conf. young scientists from the international participation. Novosibirsk, 2017;1:19-24. (In Russ.). [Авдеев А.К., Рыжиков Д.В., Губина Е.В., и др. Ближайшие результаты подтаранных биодеградируемых артроэрезисов у детей и подростков. В кн.: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием. Новосибирск. 2017;1:19-24]. URL: http://www.niito.ru/pdf/konf_tom1.pdf#page=20
- Golyuk EL. Blocking arthrosis of the calcaneus in the treatment of flexible plano-valgus deformity of the foot in children and adolescents: indications and surgical technique. *Travma*. 2016;2:23-26. (In Russ.). [Голук Е.Л. Блокирующий артро-
- риз пяточной кости в лечении гибкой плосковальгусной деформации стопы у детей и подростков: показания и техника оперативного вмешательства. *Травма*. 2016;2:23-26].
- Dams EN. Orthopedic product for the prevention and treatment of flat feet in children and adolescents. Pat. 2706977 Russian Federation, publ. 11/21/2019, Bull. No. 33. (In Russ.). [Дамс Е.Н. Ортопедическое изделие для профилактики и лечения плоскостопия у детей и подростков. Пат. 2706977 Российская Федерация, опубл. 21.11.2019, Бюл. № 33]. URL: <https://patenton.ru/patent/RU2706977C1>
- Dimitrieva AYU. Assessment of quality of life parameters in children with mobile flat feet. In: Scientific-practical. conf. on topical issues of pediatric traumatology and orthopedics. SPb. 2019:104-108. (In Russ.). [Димитриева А.Ю. Оценка параметров качества жизни у детей с мобильным плоскостопием. В кн.: Научно-практическая конференция по актуальным вопросам травматологии и ортопедии детского возраста. СПб. 2019:104-108]. URL: http://turnerreadings.org/wpcontent/uploads/2019/10/Tezisy_turner_mail.pdf#page=104
- Magomedgadzhiev RM, Magomedov KA. Flat feet in children. *Diary of science: electronic scientific journal*. 2019;6. (In Russ.). [Магомедгаджиев Р.М., Магомедов К.А. Плоскостопие у детей. *Дневник науки: электронный научный журнал*. 2019;6.]. URL: http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/6/medicine/Magomedgadzhiev_Magomedov.pdf
- Shabal'din NA, Titov FV, Gibadullin DG, Malikova LG. Analysis of the results of surgical treatment of rigid flat-valgus foot deformity in children using subtalar arthroereisis. *Polytrauma*. 2019;1:47-53. (In Russ.). [Шабалдин Н.А., Титов Ф.В., Гибадуллин Д.Г., Маликова Л.Г. Анализ результатов хирургического лечения rigid flat-valgus foot deformity у детей методом подтаранного артроэрезиса. *Политравма*. 2019;1:47-53].